

DIGESTIVE DISEASE CONSULTANTS

David H. Lebioda M.D.
Richard J. Straker M.D.
Raaj K. Popli M.D.

Barry R. Katz M.D.
Harry H. Shephard M.D.
Sanjay K. Reddy M.D.

Instucciones para la preperacion con COLYTE/NULYTELY/GOLYTE/POLYTHYLENE GLYCOL PEG 3350

El dia antes de la colonoscopia solo puede tomar liquidos claros de desayuno, almuerzo y comida; entre estos se consideran:

AGUA, JUGOS CLAROS (MANZANA, UVA BLANCA Y CRANBERRY BLANCO), CALDO DE SOPA (SIN CARNE, VEGETALES O FIDEOS), SODAS DE DIETA O REGULAR, CAFÉ NEGRO (NO LECHE O CREMA, AZUCAR ES PERMITIDO) TE, POPSICLES, GATORADE Y GELATINA (NADA DE COLOR ROJO)

A las 4:00pm empazara a tomar el Colyte/Nulytely/Golyte/Polythylene Glycol PEG 3350 preparado. Debe tomar un vaso de 8oz del laxante cada 15 a 20 minutos hasta terminar el gallon. Por favor de mantener el gallon de Colyte/Nulytely/Golyte/Polythylene Glycol PEG 3350 refrigerado pero no puede ser mezclado con hielo. Es major consumer rapidamente en lugar de poco a poco.

Los primeros movimientos de materia fecal usualmente ocurren una hora despues de empezar a tomar el Colyte/Nulytely/Golyte/Polythylene Glycol PEG 3350 y continuan por lo menos una a dos horas de haber terminado el contenido.

El sentirse lleno y con nauseas son sintomas comunes despues de los primeros vasos de haber tomado el Colyte/Nulytely/Golyte/Polythylene Glycol PEG 3350. Estos desapareceran una vez que laxante empieze a toma efecto.

FAVOR DE NO COMER O BEBER NADA 4 HORAS ANTES DE SU EXAMEN O PUEDES SER CANCELADO.

Para mas informacion, favor de comunicarse con nuestras offinas al 407-830-8661 ext 110/120 para asistencia en espanol.